

1936
Cane Medical Library

AUS DEM STÄDTISCHEN TUBERKULOSEKRANKENHAUS
HEILSTÄTTE HEIDEHAUS, HANNOVER
LEITUNG: PROF. DR. ZIEGLER

ÜBER OPERATIVE BEHANDLUNG MISCHINFIZIERTER PNEUMOTHORAX-EXSUDATE

INAUGURAL-DISSERTATION
DER
HOHEN MEDIZINISCHEN FAKULTÄT
DER
GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT ZU GÖTTINGEN
ZUR
ERLANGUNG DER DOKTORWÜRDE
VORGELEGT
VON
HANS STORZ

Referent: Prof. Dr. Ziegler
Korreferent: Prof. Dr. Straub



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Das Auftreten eines Exsudates im Verlaufe einer Pneumothoraxbehandlung stellt eine Komplikation dar, über deren Häufigkeit in der Literatur verschiedentlich berichtet wird. Die Angaben schwanken in Grenzen zwischen 40 und 70% der behandelten Fälle.

Die Art des Exsudates, seine seröse oder eitrige, sterile oder infizierte Beschaffenheit übt einen jeweiligen Einfluß auf das zugrunde liegende Leiden aus. Sie stellt die Prognose und diktiert die therapeutischen Maßnahmen.

Aus vielfältigen Erfahrungen weiß man, daß die serösen Exsudate im allgemeinen keine Verschlechterung des Krankheitszustandes verursachen. Sie sind vielmehr, da sie zum Kollaps der Lunge beitragen, oft eine willkommene Hilfe. *Königer* spricht ihnen sogar einen immunisierenden Einfluß zu. Die Mehrzahl der serösen Exsudate wird mit der Zeit resorbiert. Die Indikation zu einem Eingriff besteht daher nur dann, wenn sie nicht von selbst schwinden, sondern durch ihr stetes Wachsen den Druck im Pleuraraum erhöhen und Verdrängungserscheinungen mit Störungen der Herztätigkeit und der Atmung hervorrufen. Entlastende Punktionen schaffen hier baldige Besserung und bleiben für gewöhnlich auch der einzige Eingriff.

Ein Teil dieser Exsudate wird in der Folgezeit eitrig. Es entwickeln sich jene sterilen, tuberkulösen Empyeme, die mit gelegentlichen Temperatursteigerungen das Allgemeinbefinden beeinträchtigen. Auch diese Exsudate sollen zunächst grundsätzlich konservativ behandelt werden (*Sauerbruch*). Verschlechtert sich jedoch der Allgemeinzustand und bleiben die Temperaturen bestehen, so wird man mit Punktionen und Spülungen beginnen. Da aber bei längerem Bestehen des Eiters die Pleuren zur Schwartenbildung veranlaßt werden und eine Wiederausdehnungsfähigkeit der Lunge dann nicht mehr zu erhoffen ist, wird die Behandlung nicht beendet sein. Als letzte Maßnahmen werden plastische Operationen zur Ausführung gelangen müssen. Sie bezwecken gemäß den von *Brunner* hierfür geprägten Worten: „ubi vacuum, ibi pus“ die Beseitigung einer starr gewordenen Pleurahöhle als die Ursache der Eiterung.

Bei den unten beschriebenen, im Heidehaus operierten Fällen handelt es sich nun um eitrige Pneumothoraxexsudate, die durch Perforation eines Lungenherdes oder einer Kaverne, in einem Fall auch durch eine Brustwandfistel, sekundär infiziert wurden. Auf die chemischen und morphologischen Veränderungen

Das Exsudat kann hier nicht näher eingegangen werden. Es entstehen aus sterilen Exsudaten plötzlich infizierte, „heiße“ Empyeme, die das gesamte Krankheitsbild schlagartig ändern. Hohe Temperaturen mit steilen, septischen Fieberkurven, Schüttelfröste und allgemeiner Verfall kennzeichnen die Schwere der Erkrankung; und im Vordergrund des Interesses steht nicht mehr die Erkrankung der Lunge, sondern die eitrige Komplikation mit ihrer schweren Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens und der Gefahr des nie ausbleibenden Empyems.

Für die Prognose wird einmal die Schwere der Infektion und dann die Abwehrkraft des Körpers von großer Wichtigkeit sein. Als von vornherein ungünstig ist zu bedenken, daß neben der Komplikation als Grundkrankheit eine Eitertuberkulose der Lunge besteht; daß ferner die Pleuren mit Verklebungen und Verwachsungen nicht reagieren können, da die Elastizität der Lungen durch den bestehenden Pneumothorax aufgehoben bzw. stark beeinträchtigt wird.

Das anatomische Bild zeigt also eine „ungedeckte“ Perforation, die eine direkte Verbindung zwischen Bronchialsystem und Pleuraraum darstellt und das Pneumothoraxexsudat einer dauernden Überflutung durch infektiöses Material aussetzt. Eine mechanische Begünstigung erfährt diese Keimeinwanderung noch durch die inspiratorische Luft, die die Öffnung durchstreicht, die Infektion dadurch beschleunigt und mit jedem Atemzuge steigert. Dabei wächst aber auch der Luftdruck im Pleuraraum. Er verdrängt das Mediastinum unter schwerer Gefahr für Herztätigkeit und Atmung und veranlaßt Störungen des Atemmechanismus.

Denn während die gesunde Lunge sich inspiratorisch ausdehnt, strömt aus der erkrankten Lungenseite infolge des Überdruckes im Pneumothorax Luft in die gesunde Lunge. Andererseits strömt bei der Expiration ein Teil der ausgetretenen Luft wieder zurück, d. h. der Expiration der gesunden Seite entspricht eine Inspiration der kranken Seite und umgekehrt. Durch diese veränderten Atemverhältnisse muß die gesunde Lunge bei jeder Inspiration einen Teil ihrer Luft durch CO₂-haltige „Pendelluft“ ersetzen und vermag in nur geringem Maße CO₂-haltige frische Luft aus der Trachea anzusaugen. Das bedeutet natürlich eine schwere Beeinträchtigung ihrer Leistungsfähigkeit. Dazu besteht für sie dauernd eine erhöhte Infektionsgefahr, da mit jedem Atemzug infektiöses Material aus der kranken in die gesunde Seite verschleppt werden kann.

Die Behandlung dieser mischinfizierten Empyeme unterschied sich in den Anfängen der Brustchirurgie nur wenig von der Behandlung anderer Exsudate. Als operative Methoden kannte man Punktionen und Spülung, mit denen man aber kaum kalte Empyeme auf die Dauer zu beeinflussen vermochte. Daher galt die Prognose dieser heißen Pneumothoraxexsudate auch als absolut infaust. Durch die später folgende Dauerdrainage und Rippenresektion, die dem Eiter einen Dauerabfluß ermöglichten, wurde kein guter Enderfolg erzielt. Das Befinden besserte sich zwar anfänglich, ließ aber bald nach, da die Höhle fortgesetzt wuchs und durch den dauernden Säfteverlust die Kräfte des Patienten allmählich erschöpften.

Von Schede wurde zum ersten Male der Versuch gemacht, die Höhle als Ursache der Eiterung durch eine plastische Operation zu beseitigen. Er führte

eine totale, ausgedehnte Rippenresektion mit Beseitigung der Pleura aus und verödete die Höhle durch Hineinlegen der darüber befindlichen Weichteile. Die Operation bedeutete aber für die schon ohnehin geschwächten Patienten einen schweren Eingriff, denn die Mortalität war ungewöhnlich groß.

Die Schwere der Schedeschen Operation veranlaßte uns, den Versuch zu machen, mit Hilfe der von *Kirschner* empfohlenen Methode der Muskelimplantation zum Verschuß von Empyemresthöhlen eine Schließung der Pneumothoraxhöhle zu erreichen. Es wurde über der Resthöhle in mäßiger Ausdehnung eine Resektion der in Frage kommenden Rippen vorgenommen und in die offene Höhle besonders nach der Spitze zu Brustmuskulatur implantiert, die durch Granulationen die Höhle allmählich auskleidete und verödete. Die Durchführung der Operation und ihr Vorzug gegenüber den bisher üblichen Verfahren wird weiter unten besprochen werden.

1. Fräulein G. H., 22 Jahre, Stütze.

Vorgeschichte: Erkrankte im Sommer 1922 an linksseitiger Lungenspitzentuberkulose. Nach einer Blutung im September 1922 3 wöchige Krankenhausbehandlung. Vom 8. II. 1923 bis 24. V. 1923 Kur in Oberkaufungen. Von dort Überweisung ins Heidehaus zur Anlage eines Pneumothorax. Aufnahme am 6. VI. 1923.

Befund: Mittelkräftiges Mädchen in mäßigem Ernährungszustand. Linke Brustseite abgeflacht, bleibt bei der Atmung zurück. Lungen: Links oben Schallverkürzung mit bronchovesicalem Atmen und einigen mittelgroßblasigen Rasselgeräuschen bis 3. Rippe. Von da ab Aufhellung der Dämpfung und verschärftes Atmen bis Grenze. Über der ganzen rechten Lunge Schallabschwächung mit verschärftem Atmen. Grenzverschieblichkeit links etwas geringer als rechts.

Auswurf 20 cem. T.B. positiv. Subfebrile Temperaturen.

Röntgenaufnahme: Dichte Beschattung des linken oberen Lungensfeldes bis zur 4. Rippe. Umschriebene Aufhellungen in der Spitze bis zur 2. Rippe. Leichte Beschattung des unteren Lungensfeldes.

28. VI. 1923. Anlage eines linksseitigen Pneumothorax nach *Brauer*. Gelingt wegen breiter Adhäsionen oben seitlich und unten nur teilweise. A.D. — 10 + 10. Es werden 400 cem N bis zu einem Enddruck von — 20 + 30 nachgefüllt. In Abständen von 3—4 Tagen später 7—10 Tagen Nachfüllen von 600—800 cem N.

25. X. 1923. Linksseitige Phrenicusexhairese in Lokalanästhesie. Im November Auftreten eines Exsudates im Pneumothorax und allmählich Verschlechterung des Allgemeinzustandes. Steigen der Temperaturen bis 39°; Ansteigen des Exsudates.

27. XII. 1923. Punktion ergibt ein eitriges Exsudat; Spülungen mit phys. NaCl-Lösung in Abständen von 2—3 Tagen. Nach anfänglicher Besserung wieder Verschlechterung. Plötzlicher Temperaturanstieg bis 40°. Steile septische Zacken, Nachweis von Kokken im Exsudat.

21. I. 1924. Thorakotomie an der unteren Lungengrenze links unter der Scapula und Einnähen einer Trachealkanüle. Entleerung von 300 cem Eiter. Spülungen in den folgenden Tagen und Abfall der Temperatur auf 37,5 bis 37,9. Befinden bleibt gut. Sekret aus der Wunde wird etwas seröser. Bei Sondierung der Höhle von der Thorakotomiewunde aus kommt man 10 cm weit nach vorn, 4 cm weit nach oben und ebenso weit in Richtung auf die Wirbelsäule zu.

20. III. 1924. Totale extrapleurale Plastik (Resektion der 1. bis 11. Rippe in Lokalanästhesie). Entfernung der Rippen in großer Ausdehnung; Abtragung des alten Granulationsgewebes um die alte Fistel und Haut- und Muskelnäht bis in Höhe der Fistel. Jodoformgazetamponade. Operationswunde heilt gut zu. Sekretion aus der Wundhöhle noch recht stark. Dauerdrainage. Allmähliches Nachlassen der starken Sekretion.

13. VI. 1924. Operation in örtlicher Betäubung. Hautschnitt auf der linken vorderen Brustseite, dicht unterhalb der Clav. beginnend und bogenförmig um die Mamma verlaufend. Resektion der 2. bis 6. Rippe in Breite von 3—6 cm. Exstirpation der entsprechenden

schenrippenmuskulatur. Eröffnung einer dicht unter der stark verdickten Pleura costalis laufenden Fistel. Abtragen der Pleura in der Nähe des Fistelganges und Auskratzen mit scharfen Löffel. Tamponade mit Jodoformgaze. Da die Muskelimplantation nicht möglich, offene Behandlung. Bestrahlung mit künstlicher Höhensonne. Gute Granulation der Wundfläche durch tägliche Bestrahlung. Aus der Rückenfistel entleert sich noch wässeres Sekret, das aber immer geringer wird.

Oktober 1924. Die Rückenfistel hat sich vollkommen geschlossen. Die Wunde vorn durch Bestrahlung zusehends kleiner. Das Allgemeinbefinden wird stetig besser. Geisteszunahme. Temperatur zwischen 26,8 und 37,5.

Februar 1925. Die Wunde ist bis auf eine Öffnung, die 1 cm im Durchmesser beträgt, geschlossen.

Mai 1925. Entlassung.

Juni 1926. Nachuntersuchung. Die Resthöhle ist ausgeheilt. Vollkommener Verfall der Rückenfistel. Gutes Allgemeinbefinden.

Wiederholte Spülungen vermochten das eitrig-exsudative Exsudat nicht zu beeinflussen. Als das Allgemeinbefinden sich weiter verschlechterte und der plötzliche Temperaturanstieg auf 40°, sowie der Nachweis von Kokken auf eine Infektion hinwiesen, wurde der Thorax eröffnet und dem Eiter ein Dauerabfluß ermöglicht. Rasche Entfieberung und Besserung des Befindens. Um die Resthöhle zu beseitigen, wurde die totale, extrapleurale Plastik ausgeführt. Der Erfolg jedoch nicht der gewünschte war und ein Teil der Resthöhle noch vorhanden, schloß man 3 Monate später die vordere Plastik an. Dabei wurde die Resthöhle eröffnet und durch intensive Bestrahlung zum Zugranulieren gebracht.

2. Herr E. K., 32 Jahre, Verwaltungsassistent.

Vorgeschichte: September 1919 Lungenbluten. Zunächst ambulante Behandlung. Vom November 1920 bis April 1921 Kur in Schleddehausen. Dort Anlage eines Pneumothorax. Befinden eine Zeitlang gut. Februar bis Juni 1922 Kur in Sülzhayn. September 1922 Februar 1923 Kur in Davos. April 1924 bis August 1924 Kur in Sülzhayn. Letzte Nachuntersuchung Mai 1924 (1000 ccm N.). Am 20. Mai gestürzt. Danach Pleuritis; Fieber bis 41° und Auftreten eines Exsudates. Nachfüllungen unterbleiben. Letzte Punktion Juli 1924 ergibt 1000 ccm Eiter. Aufnahme ins Heidehaus 15. VIII. 1924.

Befund: Großer kräftiger Mann in gutem Ernährungszustand. Rechte obere Brusthälfte bleibt bei der Atmung zurück. *Lungen:* Rechts oben lauter Schall, ab 4. Rippe Dämpfung. Links allseitig aufgehobenes Atmen. Hinten medial von der Scapula unreines abgeschwächtes Atmen mit einigen groben Rasselgeräuschen. Links über der ganzen Lunge leichte Schallabschwächung und etwas verschärftes Atmen. Husten und Auswurf gering. T.B. —. Temperatur 36,9—37,2. Patient klagt über Mattigkeit und Atemnot.

Röntgenaufnahme: Guter Kollaps der rechten Lunge. Exsudat bis zum unteren Rand der 3. Rippe. Links etwas verstärkte Strangzeichnung vom Hilus nach oben verlaufend.

26. VIII. 1924. Punktion. Abziehen 1500 ccm eitrig-exsudativen Exsudates. Druckausgleich mit 10—40. Im Eiter werden T.B. nachgewiesen. Der Patient verträgt anschließende Punktionen und Spülungen schlecht. Plötzlicher Temperaturanstieg bis 40°.

23. IX. 1924. Thorakotomie und Drainage in Lokalanästhesie. Durchtrennung der Rippenknorpel rechts seitlich im 6. Intercostalraum. Stichinzision der Pleura und Einlegen einer Metallkanüle, an die ein Gummischlauch mit Quetschhahn angeschlossen wird. Naht der Muskulatur und der Haut. Ablassen von 400 ccm Eiter nach Aufrichten. Verschließen mit Drains. Steriler Verband. Temperaturabfall. Besserung des Befindens.

18. X. 1924. Rechtsseitige totale extrapleurale Plastik (Resektion der 1. bis 11. Rippe). Operation wird gut überstanden. Wunde heilt gut zu. Nachlassen, aber Fortbestehen einer eitrigen Eiterung aus der Thorakotomiefistel.

13. XI. 1924. Vordere Thorakoplastik. Hautschnitt leicht bogenförmig von Clavicula 1½ Finger breit innerhalb der rechten M.L. bis zur 11. Rippe. Zurückdrängen der Brustfettmasse. Durchtrennung des Brustmuskels etwa 5 cm vom sternalen Ansatz. Resektion von Stücken der 2. bis 10. Rippe. Im Bereich der Thorakotomiefistel Resektion bis

an die Fistel heran. Doppelte Unterbindung und Abtragung des 2. Intercostalmuskels. Eröffnung der Pleurahöhle im Bereich der 2. bis 4. Rippe. Ausschneiden eines 3×6 cm großen Fensters aus der etwa 1 cm dicken harten Pleura. Bei Eröffnung der Pleurahöhle zeigt sich eine bis in die Spitze reichende, mäßig ausgedehnte Höhle. Die Höhle wird ausgetupft und gesäubert, da die Pleura mit käsigen Massen bedeckt ist. Einstülpen des Pectoralis major und Naht. Auskratzen der alten Granulationen und Einlegen eines Drains durch die alte Fistel in die Pleurahöhle. Einnähen eines 2. Drains in den untersten Wundwinkel. Die Operation wird gut überstanden. Es bilden sich nach einiger Zeit im Bereiche der Wundfisteln, die eröffnet und täglich bestrahlt werden. Unter täglicher Bestrahlung der Wunde guter Heilungsverlauf und völliges Abklingen der Entzündungserscheinungen. Die Sekretion aus der Thorakotomiefistel wird wesentlich geringer und vom 4. Tage fleischwasserfarbig. Temperatur 36,6—37,5. Gewichtszunahme.

5. III. 1925. Entfernung des Drains aus der Thorakotomiefistel. In der vorderen Plastikwunde besteht noch eine Fistel, die gering sezerniert.

28. X. 1925. Röntgenaufnahme. Zwerchfellbewegung rechts noch deutlich sichtbar. Adhärenz des unteren Lungenteiles am Zwerchfell und Bestehen eines schmalen Höhlenspaltes.

3. XI. 1925. Phrenicusexhairese. Der vorherige schmale Spalt ist verschwunden wie eine nach einigen Tagen gemachte Röntgenaufnahme zeigte.

20. XI. 1925. Entlassung. Wunde geheilt. Verschuß der Fistel bis auf geringe oberflächliche Eiterung. Sehr gutes Befinden.

10. III. 1927. Nachuntersuchung. Sehr gutes Allgemeinbefinden. Vollkommene Heilung der vorderen Plastikwunde. *Lungen:* Rechts hinten einige Narbengeräusche, sonst o. B.

Punktionen und Spülungen, die zur Entleerung eines eitrigen Exsudates vorgenommen wurden, bereiteten dem Patienten infolge einer schwartigen Pleura costalis heftige Schmerzen. Es wurde daher eine Dauerdrainage angelegt und kurz danach eine Resektion der 5. Rippe vorgenommen, da die Temperatur plötzlich stieg. Der Dauerabfluß des Eiters besserte das Befinden in kurzer Zeit. Zur Einengung der Höhle wurde eine totale extrpl. Plastik ausgeführt. Die Höhle schloß sich jedoch nicht genügend, und es mußte eine vordere Plastik mit Implantation des Pectoralis major angeschlossen werden. Das Röntgenbild ließ aber immer noch einen schmalen Spalt erkennen, der dann durch eine Phrenicusexhairese geschlossen wurde. Die Nachuntersuchung nach 2 Jahren ergab einen völligen Verschuß der Resthöhle und ein sehr gutes Allgemeinbefinden des Patienten.

3. Herr W. P., 52 Jahre, Landwirt.

Vorgeschichte: Eltern sind an Lungentuberkulose gestorben. Erste Krankheitszeichen Februar 1923. Husten, Mattigkeit. Trockene Rippenfellentzündung. Der behandelnde Arzt stellt Ende 1923 eine progrediente rechtsseitige Tuberkulose mit Kaverne im Oberlappen fest und legte Januar 1924 einen rechtsseitigen künstlichen Pneumothorax an. April 1924 Auftreten eines serösen Exsudates. April 1925 Trübung des Exsudates. Von Mai an Spülungen mit Jodkalilösung in Abständen von 4 Tagen. Wird zur weiteren Behandlung ins Heidehaus überwiesen. Aufnahme am 3. VI. 1925.

Befund: Mittelgroßer schwächlicher Mann in schlechtem Ernährungszustande. Rechte Brustseite schleppt bei der Atmung nach. *Lungen:* Rechts oben Dämpfung bis 2. Rippe mit verschärftem Atmen und zahlreichen klingenden Rasselgeräuschen; in der Mitte volle Lungenschall. Von Mitte abwärts bis Grenze Dämpfung und stark abgeschwächtes Atmen. Links verschärftes Atmen, sonst o. B. Auswurf 10 ccm T.B. spärlich. Temperaturen zwischen 37,5 und 38,2. Klagt über Mattigkeit und Nachtschweiß.

Röntgenaufnahme: Rechts Beschattung über der ganzen Lunge. Unten Pneumothorax mit Exsudat. Links verstärkte Hiluszeichnung.

8. VI. 1925. Punktion von 200 ccm dicken gelben Eiters, der größtenteils Leukozyten, vereinzelt Lymphocyten enthält. T.B. negativ. Spülung mit 1 l verdünnter Jodlösung.

12. VI. 1925. Punktion von 300 ccm eitrigen Exsudates. Nach mehreren Spülungen in den folgenden Tagen plötzlich Verschlechterung und Temperaturanstieg auf $40,8^{\circ}$.

2. VII. 1925. Resektion der 8. Rippe rechts hinten unten in Breite von 5 cm. Eröffnung der Pleurahöhle. Entleerung einer großen Menge gelben Eiters. Drain, Verband. Täglich Verbandwechsel und Spülung. Allmählicher Temperaturabfall. Befinden bessert sich in den folgenden Tagen. Temperaturen bleiben zwischen $36,4$ und $37,5$. Aus der Pleurahöhle entleert sich immer noch viel gelber Eiter. Tägliche Spülung mit verdünnter H_2O_2 -Lösung.

3. IX. 1925. Totale extrapleurale Thorakoplastik (1. bis 11. Rippe). Die Operation ist gut überstanden. Sekretion aus der Pleurahöhle wird geringer. Plastikwunde heilt gut zu.

20. X. 1925. Vordere Thorakoplastik. Resektion von Rippenstücken der 2. bis 10. Rippe. Operation verläuft ohne Komplikation und wird gut überstanden. Befinden gut. Temperaturen zwischen $36,6$ und $37,4^{\circ}$. Gute Wundheilung. Sekretion aus der Fistel noch relativ stark. Täglich Spülungen mit Kalipermanganatlösung.

12. III. 1926. Resthöhlenoperation. Großer lappenförmiger Schnitt rechts vorn seitlich. Aufklappen von Haut und Muskulatur. Freilegen der noch stehenden Rippenstümpfe; Resektion von 4 Rippen in einer Breite von etwa 5 cm. Eröffnung der Resthöhle durch Schnitt auf einer durch die Thorakotomiewunde eingeführten Sonde. Reinigung der Resthöhle durch Auskratzen und Abtragen der Wand. Implantation des kräftigen M. serratus. Einlegen eines kurzen Drains. Naht. Operationswunde heilt mit üppigen Granulationen. Sekretion wird geringer und vom 3. Tage ab fleischwasserfarben; hört im Juni 1926 vollständig auf. Befinden des Patienten gut. Gewichtszunahme.

17. V. 1926. Röntgenaufnahme: Verschuß der Resthöhle.

15. VI. 1926. Entlassung. Nachkur in Bad Rehbürg.

Das eitrige Exsudat, das sich im Verlaufe einer Pneumothoraxbehandlung gebildet hatte, beeinträchtigte den Gesundheitszustand des Patienten sehr. Nach einigen Punktionen und Spülungen, die die Temperaturen nur auf kurze Zeit zum Sinken brachten, wurde, da das Fieber plötzlich auf $40,8$ stieg, die 8. Rippe in einer Breite von etwa 5 cm reseziert und ein Dauerabfluß des Eiters geschaffen. Die Temperatur fiel allmählich ab. Um die Resthöhle einzuengen, wurde eine totale hintere Thorakoplastik ausgeführt, und nach 5 Monaten als ergänzende Operation die vordere Plastik angeschlossen. Da die Sekretion aus der Thorakotomiefistel noch verhältnismäßig stark war, entschloß man sich zur Resthöhlenoperation mit Implantation des M. serratus. Der Erfolg war gut. Die Eiterssekretion hörte auf, und das Röntgenbild zeigte einen vollständigen Verschuß der Resthöhle.

4. Herr A. S., 20 Jahre, Kaufmann.

Vorgeschichte: Mutter an Lungentuberkulose gestorben. Patient klagt seit Juli 1924 über Husten, Mattigkeit, Nachtschweiß. August 1924: Anlage eines rechtsseitigen Pneumothorax im Krankenhaus. Seit April 1925 Exsudat, das seit dem 8. VI. 1925 eitrig ist. Punktion am 11. VI. 1925 ergab 2 l Eiter. Überweisung ins Heidehaus zur Weiterbehandlung. Aufnahme am 15. VI. 1925.

Befund: Mittelkräftiger junger Mann in mäßigem Ernährungszustand. Die rechte Brustseite bleibt bei der Atmung zurück. *Lungen:* Rechts oben bis zur 5. Rippe voller Klopfball mit abgeschwächtem unreinem Atmen. Ab 5. Rippe massive Dämpfung und aufgehobenes Atemgeräusch. Links o. B. Auswurf und Husten gering. T.B. negativ. Temperatur $38,8^{\circ}$.

Röntgenaufnahme: Rechtsseitiger Pneumothorax mit Exsudat bis 4. Rippe. Verdrängung des Herzens nach links. Linke Seite o. B.

15. VI. 1925. Punktion von 1000 ccm eitrigen Exsudates, das viele Lymphocyten enthält.

18. VI. 1925. Punktion und Spülung mit 1 l Jodtinkurlösung. Der Zustand verschlechtert sich in den folgenden Tagen. Am 22. VI. Steigen der Temperatur auf $40,7^{\circ}$.

23. VI. 1925. Rippenresektion rechts unten, seitlich. Eröffnung der Pleurahöhle. Es entleert sich eine große Menge stinkenden Eiters. Drainage, Verband. Allgemeinbefinden wird besser. Temperaturabfall. Guter Eiterabfluß. Tägliche Spülung. Aus der Höhle entleert sich fortgesetzt viel gelber Eiter.

8. IX. 1925. Totale extrapleurale Thorakoplastik. Resektion der 1. bis 12. Rippe. Operation wird gut überstanden. Sekretion aus der Pleurahöhle wird geringer. 3wöchige Spülung mit Lugolscher Lösung. Gewichtszunahme. Temperaturen zwischen 36,7 und 37,4°. Sekretion aus der Thorakotomiefistel unverändert.

26. XI. 1925. Vordere extrapleurale Thorakoplastik. Resektion von Stücken der 2. bis 9. Rippe. Operation verläuft gut. Zustand des Patienten danach gut. Am 2. XII. 1925 wird die untere Hälfte der Wunde eröffnet, da sich der Wundboden infiltriert hat und stark eitert. Tamponade. Sekretion aus der Thorakotomiefistel wird geringer. Die vordere Plastikwunde wird mit Höhensonne bestrahlt und granuliert gut zu. Allmähliche Gewichtszunahme. Besserung des Allgemeinbefindens.

2. IX. 1926. Entlassung, da die Heilstätte mit Typhuskranken belegt wird. Aus der engen Thorakotomiefistel entleeren sich nur noch Spuren serösen Exsudates.

Da trotz Punktionen und Spülungen der Allgemeinzustand sich zusehends verschlechterte, wurde eine Rippenresektion und Dauerdrainage vorgenommen. Zur Beseitigung der Resthöhle wurde zunächst die hintere Plastik und, da noch ein schmaler Höhlenspalt bestehen blieb, nach 2 Monaten die vordere Plastik ausgeführt. Die Sekretion aus der Resthöhle ließ nach kurzer Zeit erheblich nach und wurde vorwiegend serös; die Resthöhle brauchte daher nicht eröffnet zu werden. Bei der Entlassung wiesen Spuren serösen Exsudates darauf hin, daß sich die Resthöhle weitgehend geschlossen hatte und im Ausheilen begriffen war.

5. Herr A. W., 23 Jahre, Arbeiter.

Vorgeschichte: Im November 1924 Husten, Nachtschweiß, leichte Temperaturen. Aufnahme ins Städtische Krankenhaus Hannover. April 1925 Auftreten eines Spontanpneumothorax, der während der Krankenhausbehandlung vereiterte. Überweisung ins Heidehaus zur Weiterbehandlung. Aufnahme am 1. XII. 1925.

Befund: Schwächlicher junger Mann in schlechtem Ernährungszustande. Linke Brustseite bleibt bei der Atmung zurück. *Lungen:* Links Schallabschwächung bis 3. Rippe und abgeschwächtes Atmen mit einigen flüssigen Rasselgeräuschen. Von Mitte bis Grenze massive Dämpfung und aufgehobenes Atmen. Rechts verschärftes Atmen, ab 5. Rippe grobe Rasselgeräusche. Husten und Auswurf gering.

Röntgenaufnahme: Linksseitiger Pneumothorax mit Exsudat bis zum oberen Rande der 4. Rippe. Rechts Schatten in der Spitze und verstärkte Hiluszeichnung. Verdrängung des Herzens nach rechts.

3. XII. 1925. Probepunktion ergibt Eiter, der T.B. enthält. Allgemeinzustand verschlechtert sich plötzlich. Temperaturanstieg bis 41°.

10. XII. 1925. Thorakotomie. Resektion der 8. Rippe in einer Breite von etwa 6 cm. Entleeren von etwa 1 l dicken gelben Eiters. Einsicht in eine sehr tiefe Höhle. Verband, Drainage. In den nächsten Tagen noch starke Sekretion. Befinden bessert sich langsam. Temperaturabfall auf 37,5°.

5. I. 1926. Untere extrapleurale Thorakoplastik, Resektion der 6. bis 12. Rippe. Operation wird gut überstanden.

26. I. 1926. Obere extrapleurale Thorakoplastik, Resektion der 1. bis 5. Rippe.

19. IV. 1926. Röntgenaufnahme: Links besteht noch nach totaler Plastik eine Resthöhle.

30. IV. 1926. Resthöhlenoperation in typischer Weise. Bogenförmiger Schnitt. Resektion der 3. bis 10. Rippe und Muskelimplantation. Da die Wunde nur geringe Granulationsbildung zeigt, tägliche Höhensonnenbestrahlung. Sekretion aus der Resthöhle läßt erheblich nach.

6. V. 1927. Wunde noch handteller groß mit guten Granulationen. Epithelisierung vom Rande her. Rückenfistel sezerniert noch wenig. Befinden gut. Temperaturen zwischen 36,5 und 37,2°. Gewichtszunahme.

28. XII. 1927. Wunde und Resthöhle haben sich weiter verkleinert. Rückenfistel gerinnert nur noch Spuren. Befinden gut.
9. XII. 1928. Entlassung des Patienten, da die Heilstätte mit Typhuskranken belegt ist. Überweisung zur Nachbehandlung ins Joseph-Stift.
19. IV. 1929. Bericht des behandelnden Arztes, daß es dem Patienten sehr gut geht. Die Wunde ist bis auf einen schmalen Spalt geschlossen. Sekretion aus der Rückenfistel sehr gering.

Im Anschluß an einen Spontanpneumothorax entstand ein eitriges Exsudat, mehrmals punktiert wurde. Plötzlicher Temperaturanstieg und Verschlechterung des Allgemeinbefindens indizierten eine Thorakotomie, die das Befinden verbesserte. Die hintere Plastik und die Resthöhlenoperation mit Muskelimplantation konnten die Höhle nicht vollständig schließen. Durch langwierige konservative Behandlung mit Höhensonnenbestrahlungen wurde eine allmähliche Verkleinerung der Höhle und ein Nachlassen der Rückenfistelsekretion erreicht. Das Befinden verbesserte sich erheblich. Der Patient mußte entlassen werden, da die Heilstätte mit Typhuskranken belegt wurde. Der ihn zur Zeit behandelnde Arzt teilt mit, daß es dem Patienten gut ginge; die Rückenfistel habe sich fast geschlossen und die Höhle bis auf einen kleinen Spalt geschlossen.

6. Herr W. N., 21 Jahre, Kaufmann.

Vorgeschichte: Im Januar 1925 Bluthusten. Heidehausbehandlung von Januar bis Februar 1925. Diagnose einer linksseitigen Tuberkulose und Anlage eines Pneumothorax. Regelmäßige Nachfüllungen. September 1925 Auftreten eines Exsudates, das sich im Januar 1926 wieder aufnahm. Wiederaufnahme ins Heidehaus am 22. II. 1926.

Befund: Großer, blaß aussehender mittelkräftiger Mann in mäßigem Ernährungsgrade. Die linke Brustseite bleibt bei der Atmung zurück. *Lungen:* Links ab 3. Rippe Dämpfung mit abgeschwächtem Atmen und einigen Rasselgeräuschen. Bis Grenze massive Dämpfung und aufgehobenes Atmen. Über der ganzen rechten Lunge verschärftes Atmen. Temperaturen bis $37,5-38,5^{\circ}$.

Röntgenaufnahme: Links großer Pneumothorax mit Exsudat bis 3. Rippe. Rechts o. B.

26. u. 27. II. 1926. Punktionen von 700 ccm eitrigen Exsudates. Das Befinden ist schlecht.

3. III. 1926. Bluttransfusion von 300 ccm. Verschlechterung und Temperaturanstieg auf $40,7^{\circ}$.

5. III. 1926. Thorakotomie links. Resektion von 5 cm der 8. Rippe. Entleerung einer großen Menge gelben Eiters. Drain, Verband. Nach anfänglicher Besserung wieder Verschlechterung des Befindens. Unregelmäßiges hohes Fieber.

24. III. 1926. Da der Eiterabfluß nicht vollständig erfolgt, Resektion von 5 cm der 9. Rippe und breite Öffnung einer verdickten Pleura. Doppeldrain, Verband. Starke Sekretion aus der Resthöhle. Besserung.

7. V. 1926. Totale hintere Plastik (Resektion der 1. bis 12. Rippe). Operation wird überstanden. Wunde heilt primär.

21. V. 1926. Vordere Plastik (Resektion der 2. bis 10. Rippe). Befinden gut. Nach anfänglicher schmutziggrauer Eitersekretion gute Granulation und Verheilung der Wunde. Schleimig-eitrige Sekretion aus der Resthöhlenfistel.

20. VII. 1926. Resthöhlenoperation. Bogenförmiger Schnitt einbiegend in die Thorakowunde. Eröffnung der Resthöhle; Muskelimplantation kann in Ermangelung eines ausreichenden Muskels nicht erfolgen. Daher nur Abtragung der Resthöhlenwand, Reinigung der Wunde und Tamponade. Tägliche Höhensonnenbestrahlung. Die Wunde granuliert und verkleinert sich.

26. VIII. 1926. Die Wunde hat sich weiter verkleinert. Sekretion aus der Rückenfistel gering. Befinden gut. Gewichtszunahme.

14. IX. 1926. Entlassung. Überweisung zum Joseph-Stift zur Nachbehandlung.

19. IV. 1929. Bericht des behandelnden Arztes, daß es dem Patienten sehr gut ging. Gewichtszunahme von 40 Pfund. Die Rückenfistel sezernierte nicht mehr und die Resthöhle sei geschlossen.

In einem großen Pneumothorax entstand ein Exsudat, das bald eitrig wurde. Da die Temperaturen hoch stiegen und der Allgemeinzustand sich sehr verschlechterte, wurde durch eine ausgedehnte Thorakotomie dem Eiter ein Abfluß geschaffen. Nach hinterer und vorderer Plastik sollte die Resthöhle durch Muskelimplantation verödet werden. Da aber keine kräftige Muskulatur bestand, wurde die Wunde nicht verschlossen und die Höhle durch tägliche Höhensonnenbestrahlung zum Granulieren gebracht, und nach dem Bericht des den Patienten zur Zeit behandelnden Arztes ein fast völliger Verschuß der Höhle erreicht.

7. Herr W. V., 31 Jahre, Bergmann.

Vorgeschichte: Vater und eine Schwester an „Lungenleiden“ gestorben. Juni 19 Feststellung einer kavernenösen linksseitigen Lungentuberkulose. September 1923 Spontaner Pneumothorax. Darauf Punktion von etwa 3 l Eiter, der massenhaft Tuberkelbacillen enthält. Januar 1924 Perforation des Exsudates nach außen. Juni 1924 Fistelschluß. Mehrere Punktionen bis zum Dezember 1924. Überweisung ins Heidehaus. Aufnahme am 9. I. 1925.

Befund: Mittelkräftiger Mann in mäßigem Ernährungszustande. Zwischen 6. und 7. Rippe eine 5 cm lange Incisionsnarbe mit linsengroßer, gering sezernierender Fistel. Linke Brustseite ist abgeflacht; bleibt bei der Atmung zurück. *Lungen:* Links oben Schallabschwächung mit mittelgroßblasigen, leise klingenden Rasselgeräuschen. Ab 4. Rippe intensive Dämpfung mit sehr stark abgeschwächtem Atmen. Succussio Hippocratis. Über rechter Spitze verschärftes Atmen. Husten wenig. Auswurf 3 ccm. Temperaturen zwischen 37 und 37,7°.

Röntgenaufnahme: Links Pneumothorax mit Adhäsion oben. Exsudat bis 4. Rippe. Rechts o. B.

16. I. 1925. Punktion am 25. I. 1925 und 5. III. 1925. Wiederholen der Punktion von 300 ccm eines stark getrübbten dünnflüssigen Exsudates. T.B. negativ.

7. III. 1925. Totale extrapleurale Thorakoplastik. Resektion der 1. bis 11. Rippe. Drainage, Muskel- und Hautnaht. Eingehen in den Pneumothorax mit einem Troicart von oben im 3. Interostalraum und Ablassen der Überdruckluft. Wunde wird wegen schlechter Granulationsbildung mit Höhensonne bestrahlt. Befinden verschlechtert sich. Punktion 110 ccm eitriges Exsudat. Eröffnung der Thorakotomiefistel und Abziehen von 1 1/2 dünnen flüssigen Exsudates. Besserung. Fieberfall und Heilungstendenz der Wunde. Resthöhle sezerniert noch stark. Tägliche Spülung und Drainage.

28. VIII. 1925. Vordere Thorakoplastik und breite Eröffnung der Höhle. Hautschnitt bis zur Fistelöffnung und Resektion der 2. bis 7. Rippe. Eröffnung der Höhle, die nach oben bis unter die Clavicula, nach medial bis zu den Rippenknorpeln, nach unten bis zur 7. Rippe sich erstreckt. Breite Abtragung der Pleura. Reinigung der Höhle, da die Muskelimplantation nicht gelingt. Höhensonnenbestrahlung. Gute Granulationsbildung. Die Wundhöhle granuliert gut zu und zeigt starke Schrumpfungstendenzen. Befinden gut. Sekretion noch relativ stark, Haut der äußeren Brustwand hat sich in die Höhle eingestülpt.

11. II. 1926. Nachoperation. Da sich die Haut der äußeren Brustwand stark in die Resthöhle hineingeschoben hat, wird die Übergangsstelle von Haut und granulierender Fläche durchtrennt und Haut mit Muskel- und Fettgewebe nach außen gebracht. Verschlechterung des Befindens durch Auftreten eines Erysipels, das nach 14 Tagen wieder abgeklungen ist. Weitere Verkleinerung der Höhle auch von der Tiefe aus. Befinden gut. Gewichtszunahme.

14. IX. 1926. Entlassung des Patienten wegen Überfüllung der Heilstätte mit Typhuskranken.

28. II. 1927. Wiederaufnahme zur Nachbehandlung. Wunde noch handtellergroß. Epithelisierung vom Rande her. Tägliche Bestrahlung.

6. IV. 1927. Wundkorrektur. Der seitliche Hautmuskellappen wird mobilisiert und oberen und unteren Wundpol mit dem medialen Wundrand vernäht. Die Wunde ist durch die Korrektur wesentlich verkleinert. Sekretion aus der Höhle gering.

6. VIII. 1927. Entlassung. Juli 1928 Vorstellung des Patienten; Befinden gut; Höhle sich weiter verkleinert, die Pleura pulm. liegt noch in einer Ausdehnung von 4×6 cm. Geringe Sekretion aus der Höhle.

Im Anschluß an eine linksseitige, kavernöse Lungentuberkulose entstand spontanpneumothorax mit dünnflüssig-eitrigem Exsudat. Der Kranke überlebte die anfänglich stürmischen Erscheinungen und wurde zur Weiterbehandlung ins Heidehaus eingewiesen. Da die hohen Temperaturen abgeklungen waren, wurde nach mehreren entlastenden Punktionen zur Einengung der Höhle die hintere Plastik und nach 5 Monaten die vordere Plastik ausgeführt werden. Am 1. wurde die Resthöhle durch breite Resektion der parietalen Pleura eröffnet und durch intensive Sonnenbestrahlung zur Verkleinerung gebracht. Bei der Vorstellung 1 Jahr nach der Entlassung zeigte sich, daß die Höhle bis auf eine kleine Fläche zugranuliert war. Die Sekretion war nur noch gering; das Allgemeinbefinden gut.

8. Herr R. S., 27 Jahre, Steuerpraktikant.

Vorgeschichte: Im Anschluß an eine Grippe wurde im Februar 1927 eine linksseitige Lungentuberkulose festgestellt. Kur in St. Blasien vom 16. V. bis 21. X. 1927. Nach einer Blutung Pneumothoraxanlage am 27. Mai 1927. November 1927 Punktion von 750 ccm Exsudates. April 1927 Punktion von 500 ccm eines eitrigem Exsudates. T.B. positiv. Überweisung ins Heidehaus. Aufnahme am 13. IV. 1928.

Befund: Mittelkräftiger blasser Mann in mäßigem Ernährungszustand. Linke Brust bleibt bei der Atmung zurück. *Lungen:* Links massive Dämpfung bis Grenze; aufgetragenes Atmen; kein Stimmfremitus. Rechts rauhes, verschärftes Atmen. Husten, Auswurf gering. Temperaturen zwischen $36,8$ und $37,1^\circ$.

Röntgenaufnahme: Links Pneumothorax mit Exsudat bis 2. Rippe. Rechts o. B. 14. IV. 1928. Punktion von 1000 ccm eitrigem Exsudates. T.B. negativ. 17. bis 19. IV. tägliche Punktionen. Befinden leidlich. Temperaturen $37-37,5^\circ$.

24. IV. 1928. Obere Thorakoplastik; Resektion der 1. bis 6. Rippe. Gute Wundheilung.

14. V. 1928. Untere Thorakoplastik; Resektion der 7. bis 12. Rippe. Am 3. Tage nach der Operation plötzlicher Temperaturanstieg auf $40,5^\circ$.

17. V. 1928. Thorakotomie. Resektion der 7. Rippe in Ausdehnung von 3 cm. Entlassung einer großen Menge Eiters. Drain, Verband.

4. VI. 1928. Röntgenaufnahme zeigt einen unvollkommenen Schluß der Pneumothoraxhöhle.

1. VII. 1928. Entlassung auf eigenen Wunsch. Fistel entleert noch täglich Eiter. Befinden gut.

Bericht des Fürsorgearztes $\frac{3}{4}$ Jahr später, daß es dem Patienten durchaus gut gehe und daß er seiner Bürotätigkeit wieder vollkommen nachgehe.

In einem linksseitigen Pneumothorax, der wegen starker Blutung angelegt wurde, entstand ein Exsudat, das bald eitrig wurde. Mehrere Punktionen vermochten das Befinden des Patienten etwas zu bessern. Es wurde zur Verengung der Höhle eine 2seitige hintere Thorakoplastik ausgeführt. Da sich der Allgemeinzustand mit einem Temperaturanstieg auf $40,5^\circ$ plötzlich verschlechterte, wurde eine Thorakotomie gemacht und dem Eiter ein Dauerabfluß geschaffen. 6 Wochen später verließ der Patient auf eigenen Wunsch die Anstalt, obwohl die Fistel noch sezernierte und das Befinden nicht nach Wunsch war.

Der Fürsorgearzt berichtet nach $\frac{3}{4}$ Jahr, daß es dem Patienten zur Zeit ginge, und daß er seit mehreren Monaten seiner Bürotätigkeit wieder vollkommene nachgehe.

9. Herr E. M., 31 Jahre, Invalide.

Vorgeschichte: Im Jahre 1917 trockene Rippenfellentzündung. 1920/21 feuchte Rippenfellentzündung links. Mehrere Punktionen von klarem Exsudat. Während der darauffolgenden Krankenhausbehandlung hintere Thorakotomie wegen eitrig-tuberkulösen Exsudates. Überweisung ins Heidehaus zur Weiterbehandlung. Aufnahme am 25. IV. 1928.

Befund: Kleiner schwächlicher Mann in schlechtem Ernährungszustand. Linke Brustseite schleppt bei der Atmung nach. Links hinten Narbe und Fistel nach Thorakotomie. *Lungen:* Links Schallabschwächung mit Tympanie; verschärftes Atmen bis 3. Rippe, von dort bis Grenze aufgehobenes Atmen und Dämpfung. Rechts rauhes, verschärftes Atmen. Husten und Auswurf gering. Temperaturen bis 39° .

Röntgenaufnahme: Pneumothorax mit seitlichen Adhäsionen links. Exsudat bis 3. Rippe. Rechts leichte Beschattung oben.

8. V. 1928. Obere Thorakoplastik. Resektion der 1. bis 6. Rippe.

22. V. 1928. Untere Thorakoplastik. Resektion der 7. bis 12. Rippe. Gute Wundheilung. Tägliche Entleerung von 40 ccm, später von 10 ccm Eiter aus der alten Thorakotomiefistel. Temperaturen bis $37,3^{\circ}$.

14. VI. 1928. Die alte Thorakotomiewunde wird um 7 cm erweitert, da der Eiterabfluß behindert ist.

24. VII. 1928. Vordere Thorakoplastik. Resektion der 2. bis 8. Rippe. Eröffnung der Resthöhle. Abtragen von Stücken der Pleura parietalis und Implantation des Brustmuskels. Drainage, Hautnaht, Sekretion aus der Thorakotomiefistel wird nach 3 Tagen fleischwasserfarben und in den folgenden Tagen wesentlich geringer.

7. VIII. 1928. Röntgenaufnahme: Resthöhle ist völlig geschlossen; Lunge gut kollabiert.

22. VIII. 1928. Entlassung auf eigenen Wunsch. Allgemeinzustand des Patienten gut. Temperaturen normal. Kein Husten, kein Auswurf. Die Fistel sezerniert nur noch Spuren seröser Flüssigkeit.

Wegen eines eitrig-tuberkulösen Exsudates links wurde im Krankenhaus eine Thorakotomie ausgeführt. Der Patient wurde zur Weiterbehandlung ins Heidehaus überwiesen. Der Befund ergab einen linksseitigen Pyopneumothorax. Nachdem sich das Befinden einigermaßen gebessert hatte, wurde zur Einengung der Resthöhle eine 2zeitige hintere Thorakoplastik ausgeführt. Da die Fistel noch sezernierte, wurde nach 2 Monaten eine vordere Thorakoplastik mit Eröffnung der Resthöhle und Implantation des Brustmuskels vorgenommen und ein vollständiger Verschluß der Höhle erzielt. Bei der Entlassungsuntersuchung sezernierte die Fistel nur noch Spuren serösen Exsudates. Das Allgemeinbefinden war gut.

10. Herr K. H., 22 Jahre, Klempner.

Vorgeschichte: Erkrankte 1927 mit Husten und blutigem Auswurf. September 1927 Blutsturz. Aufnahme ins Krankenhaus. Dort Diagnose einer offenen Lungentuberkulose und Anlage eines Pneumothorax rechts im Dezember 1927. Nach der 2. Nachfüllung Auftreten von Schmerzen, Fieber, Gewichtsabnahme. Punktion eines trüben Exsudates, Überweisung ins Heidehaus. Aufnahme am 24. I. 1928.

Befund: Schwächlicher, elend aussehender junger Mann in schlechtem Ernährungszustand. Rechte Seite bleibt bei der Atmung zurück. *Lungen:* Rechts von Spitze bis 6. Rippe Dämpfung mit tympanitischem Beiklang. Broncho-vesiculäre Atmung mit knackenden Rasselgeräuschen. Von da ab bis Grenze massive Dämpfung mit stark abgeschwächtem Atmen. Husten, Auswurf. T.B. positiv. Temperaturen bis 38° .

Röntgenaufnahme: Rechts Spitze frei, zwischen 2. und 4. Rippe intensiver Schatten seitlicher Aufhellung. Seitlicher Pneumothorax mit Exsudat. Unten konfluierende Wandschatten. Links verstärkte Hiluszeichnung.

1. II. 1928. Bluthusten, Pneumothoraxnachfüllung. Befinden leidlich.

4. II. 1928. Totale einseitige Thorakoplastik rechts. Resektion der 1. bis 12. Rippe. Am Ende der Operation kollabierte der Patient, kleiner irregulärer Puls. Nach Cardiazol und Infusion von 100 ccm NaCl Besserung. Am Operationstage noch 2 mal Tropfeinlauf von 500 ccm phys. NaCl-Lösung + 20 Tropfen Digipurat. Am folgenden Tage Temperaturen bis 40°. Temperaturen bleiben in den nächsten Wochen zwischen 38 und 39°. Wundheilung gut.

7. V. 1928. Punktion eines dünnflüssigen eitrigen Exsudates. Allgemeinzustand verschlechtert sich. Temperaturen über 40°.

14. V. 1928. Thorakotomie und Entleerung einer großen Menge dünnflüssigen Eiters. Drainage, feste Tamponade. Nach anfänglicher Besserung zunehmende Verschlechterung, besonders der Atmung und des Pulses. Temperatur bleibt über 40°.

22. V. 1928. Exitus letalis.

Unter Schmerzen und Temperaturanstieg entstand in einem rechtsseitigen Pneumothorax ein Exsudat, das im Laufe der Krankenhausbehandlung eitrig wurde. 3 Wochen nach der Überweisung ins Heidehaus wurde, als das Befinden des Patienten sich einigermaßen gebessert hatte, eine einzeitige, totale hintere Thorakoplastik ausgeführt. Der Zustand verschlechterte sich in den nächsten Wochen. Die Punktion ergab ein dünnflüssiges Exsudat, das reichlich T.B. enthielt. Da das Fieber weiter stieg, wurde dem Eiter durch eine Thorakotomie ein Dauerabfluß geschaffen. Nach anfänglicher Besserung trat eine akute Verschlechterung ein, die die Kräfte des Patienten erschöpfte. Auftreten von Kollapstemperatur und Tod.

11. Herr R. B., 27 Jahre, Student.

Vorgeschichte: Erkrankte 1926 an rechtsseitiger Lungentuberkulose. Anlegung eines Pneumothorax. Auftreten von Exsudat, das punktiert wurde. Überweisung zur operativen Behandlung ins Heidehaus. Aufnahme am 16. I. 1928. 31. II. hintere obere Thorakoplastik; 1. III. hintere untere Plastik. Entlassung zur Nachkur. Wiederaufnahme 14. II. 1929, als das Befinden sich verschlechterte.

Befund: Junger Mann in mäßigem Ernährungszustand. Rechts hinten Thorakoplastiknarbe. *Lungen:* Rechts vorn Dämpfung bis Grenze. Leises broncho-vesiculäres Atmen mit hörlichen Rasselgeräuschen hinten idem. Links o. B. Auswurf mäßig. T.B. positiv. Temperatur um 38,1°.

Röntgenaufnahme: Rechts nach Plastik Spontan-Pneumothorax mit Exsudat.

20. I. 1929. Punktion von 10 ccm Eiter.

21. I. 1929. Thorakotomie: 6 cm langer Schnitt rechts seitlich in Höhe der Punktionsstelle. Rippenresektion in Ausdehnung von 6 cm. Entleerung von Eiter. Drainage, Tamponade. Befinden bessert sich, Eiterresektion noch stark.

5. VII. 1929. Resthöhlenoperation. Großer seitlicher Bogenschnitt. Abpräparieren des Haut-, Fett- und Muskellappens. Resektion der Rippen über der Resthöhle. Unterbindung und Abpräparieren der Interkostalmuskulatur samt Gefäßen. Abtragung der vorderen Resthöhlenwand und Anfrischen mit dem scharfen Löffel, wobei die Lungen-Pleurafistel in der Tiefe der Wunde sichtbar wird. Einstülpen und Fixation von Muskulatur in das Wundbett.

7. VII. 1929. Wunde sezerniert wenig. Sekret serös-blutig.

13. VII. 1929. Befinden gut. Wunde sezerniert noch Spuren. Druckverband.

In einem rechtsseitigen Pneumothorax entstand ein Exsudat, das mehrmals punktiert wurde. Da die Sekretion nicht nachließ, wurde zur Einengung der Resthöhle eine zweizeitige hintere Plastik ausgeführt, die den Zustand auf die Dauer jedoch nicht zu heben vermochte. Da das Fieber plötzlich anstieg, wurde eine Thorakotomie gemacht, die das Befinden bald besserte. Die Thorakotomie-

fistel sezernierte jedoch noch, und es mußte zur Verödung der Resthöhle eine Resthöhlenoperation mit Implantation der Brustmuskulatur vorgenommen werden. Die Sekretion ließ schon am nächsten Tage nach und hat zur Zeit ganz aufgehört. Das Befinden des Patienten ist gut.

Behandlungsplan.

Da Spülungen bei diesen infizierten Formen die Giftwirkung auf die Dauer nur unwesentlich zu vermindern und den Gesamtzustand nur wenig zu heben vermochten, wurde in der Regel mit der *Thorakotomie* begonnen und dem Eiter ein Dauerabfluß geschaffen. Um bei Bestehen einer Lungenfistel den Schäden der „paradoxen Atmung mit Pendelluft und Mediastinalflattern“ zu begegnen wurde nach fester Tamponade der Wunde das abführende Drain mit einem Quetschhahn versehen und die offene Verbindung mit der Außenluft geschlossen. Außerdem konnte in allen Fällen mit dem natürlichen Schutzwall eines durch lange Eiterung starr gewordenen Mittelfells gerechnet werden. Sobald durch die Thorakotomie die erwünschte Entfieberung und die Besserung im Allgemeinbefinden erzielt war, wurde zur Einengung der Pneumothorax-Resthöhle die *hintere* extrapleurale *Thorakoplastik* nach *Sauerbruch* und als ergänzende Operation meist noch die *vordere* Thorakoplastik ausgeführt.

Bei 2 Patienten konnte mit diesem extrapleuralen Vorgehen eine allmähliche Schließung der Resthöhle erreicht werden. In den übrigen Fällen zeigten die schwierig veränderten Pleuren jedoch keine Neigung zum Verkleben, und es blieb eine Höhle bestehen, die die eitrige Sekretion dauernd unterhielt. Zur Beseitigung der Höhle mußte eine *Resthöhlenoperation* angeschlossen werden, die von den bisher üblichen Formen der Brustwandresektion mit Weichteildeckung abweicht. Sie stellt eine Modifikation der Muskelimplantation nach *Kirschner*, angewandt auf eine Pneumothoraxhöhle, dar und erfordert gegenüber den früheren Resthöhlenoperationen, bei denen zur Freilegung der Höhle und der tiefer liegenden Nischen und Buchten eine ausgiebige Brustwandresektion notwendig erschien, eine Rippenresektion in geringerer Ausdehnung. Man wird es ferner nicht als gleichgültig erachten können, ob durch Muskelimplantation am möglichst tiefsten Punkte der Höhle der natürliche Heilweg von innen nach außen nachgeahmt wird, oder ob man durch einfache Überdeckung der Weichteile den umgekehrten Weg geht.

In allen Fällen, in denen die Implantation vorgenommen wurde, ließ schon nach 3 bis 4 Tagen eine fleischwasserfarbene Fistelsekretion darauf schließen, daß ein Organisieren der Höhle durch die implantierten Muskel begonnen hatte. Bei den Patienten, bei welchen die Implantation in Ermangelung eines kräftigen Muskels nicht vorgenommen werden konnte, wurde die *offene* Resthöhle durch *Bestrahlung* mit künstlicher Höhensonne zur Granulationswucherung und zum allmählichen Verschuß gebracht.

Durchführung der Resthöhlenoperation.

Großer Schnitt, der etwa $1\frac{1}{2}$ Finger innerhalb der Mamillarlinie von der Clavicula bogenförmig zur Achsellinie in jeweils verschiedener Rippenhöhe verläuft. Hochklappen von Haut und Muskulatur; Freilegen und Resektion von

offenstücken, je nach der Größe der Höhle und des zu implantierenden Muskels. Eröffnung der Resthöhle durch Abtragen der parietalen Pleuraschwarte. Überführung und Anfrischung der Höhlenwand durch Auskratzen. Implantation des Muskels (pectoralis, serratus), Drainage, Tamponade, Naht, Verband.

Die in dieser Weise behandelten Fälle, von denen nur einer ad exitum kam, zeigten aber trotz zuweilen sehr schlechten Gesamtzustandes geheilt wurden, gehören zu jenen Empyemen, deren infauste Prognose in der Literatur mit einer Mortalität von 80% und darüber belegt ist.

Das Ergebnis stellt einen Erfolg dar, der zu weiterem Vorgehen in dieser Richtung sehr ermutigt.

Literaturverzeichnis.

Brunner, Die chirurgische Behandlung der Lungentuberkulose. 1924. — Frank-Kellner, Beitr. Klin. Tbk. **65**, H. 2 u. 3 (1926). — Kirschner, Arch. klin. Chir. **117**, H. 2 (1921). — Kellner, Chirurgische Operationslehre. Bier, Braun, Kümmel. — Landgraf, Beitr. Klin. Tbk. **45** (1920). — Melchior, Bruns' Beitr. **145**, H. 3 (1928). — Sauerbruch, Chirurgie der Brustorgane **2** (1925). — Beitr. Klin. Tbk. **65**, H. 2 u. 3 (1926). — Wildegans, Arch. klin. Chir. **117**, H. 3 (1921). — Schede, J., Kongreß d. Dtsch. Ges. f. Chir. **2**, 80 — Verh. d. Kongr. intern. Med. **9** (1890). — Ziegler, 11. Internationale Tuberkulosekonferenz 1913.

Lebenslauf.

Ich wurde am 20. Mai 1906 in Gnesen als Sohn des Rechnungsrates Wilhelm Storz geboren.

Nach dreijähriger Vorschulzeit besuchte ich das Gymnasium in Gnesen bis zum Jahre 1920. Durch die Versetzung meines Vaters nach Göttingen besuchte ich von da ab das Göttinger Gymnasium und bestand im Februar 1924 daselbst die Reifeprüfung.

Im Frühjahr 1925 ließ ich mich an der Georgia-Augusta-Universität der medizinischen Fakultät immatrikulieren und bestand nach viersemestrigem Studium in Göttingen die ärztliche Vorprüfung. Auch die sechs klinischen Semester studierte ich in Göttingen und beendete das Studium im Frühjahr 1930.
